

**ANKIETA PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ**  
(Prosimy o uważne przeczytanie i wypełnienie ankiety )

Nazwisko i imię: .....

PESEL: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WAGA: ..... kg

1. Badanie jest bezbolesne i trwa około 10 min. W trakcie badania wykorzystuje się promieniowanie jonizujące, dlatego bezwzględny przeciwwskazaniem jest ciąża.
2. W dniu badania z użyciem środka kontrastowego należy:
  - być na czczo, lub 5 godzin po posiłku
  - zażyć leki, które są stale przyjmowane popijając małą ilością wody niegazowanej
  - zabrać ze sobą wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, TK, MRI)
  - przynieść wynik poziomu kreatyniny (wykonany najlepiej nie wcześniej niż 2 tyg przed badaniem)
  - w przypadku występowania u Pana/Pani chorób tarczycy prosimy też o wynik poziomu TSH
  - pacjenci karmiący powinny odciągnąć pokarm przed badaniem i po podaniu kontrastu powinny zaprzestać karmienia przez okres 24 h
3. Choroby przebyte i obecnie istniejące (Proszę przekreślić nieprawidłową odpowiedź)
  - choroby tarczycy (jakie?) ..... [TAK][NIE]
  - choroby nerek (jakie?) ..... [TAK][NIE]
  - cukrzyca ..... [TAK][NIE]

**WAŻNE:** Pacjenci, którzy przyjmują leki z grupy metforminy:  
(FORMETIC, GLUFORMIN, METFOGAMMA, METFORMAX, METFORMIN, METAFOR, SIOFOR, METFORATIO)  
należy odstawić na 48 godzin przed badaniem po porozumieniu z lekarzem prowadzącym i 48 godzin po badaniu

- nadciśnienie (ciężka postać?) ..... [TAK][NIE]
  - padaczka ..... [TAK][NIE]
  - choroby serca (zawał?) ..... [TAK][NIE]
  - niewydolność wątroby (żółtaczka, HBS, HCV?) ..... [TAK][NIE]
  - uczulenia, alergię (podwyższony poziom histaminy w surowicy, katar sienny?)..... [TAK][NIE]
  - nowotwory kości (nerczyce?) ..... [TAK][NIE]
  - inne choroby (jakie?) ..... [TAK][NIE]
4. Po podaniu środka kontrastowego może wystąpić uczucie ciepła, oraz bardzo rzadko inne reakcje uboczne (nudności, wymioty, pokrzywka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia, drgawki, napad padaczkowy, wstrząs, zatrzymanie krążenia) Powikłania występują najczęściej w ciągu 20 minut od podania kontrastu, dlatego pacjent po zakończonym badaniu pozostaje w poczekalni ok 30 min, pod obserwacją pośrednią pielęgniarki. Jeżeli po wyznaczonym czasie pacjent czuje się dobrze, pielęgniarka usuwa wkłucie i pozwala na wyjście z pracowni. W przypadku, gdy pacjent czuje się źle powinien natychmiastowo powiadomić personel pracowni. Po dożylnym podaniu kontrastu obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługi urządzeń precyzyjnych przez przynajmniej 1 godzinę od badania.
  5. W pierwszej dobie po badaniu zaleca się wypicie ok 2,5 litra płynów (woda niegazowana, herbata)

Oświadczam, że moje odpowiedzi są zgodne ze stanem faktycznym mojego zdrowia, nie zataiłem/am żadnych istotnych informacji o stanie mojego zdrowia oraz zostałem/am poinformowany/a o możliwości powikłań związanych z podaniem środka kontrastowego,

.....  
(podpis pacjenta/opiekuna)

Wyrażam zgodę na wykonanie badania z użyciem promieniowania jonizującego i podaniem środka kontrastowego  
Oświadczam, że nie jestem w ciąży

.....  
(podpis pacjenta/opiekuna)

Pacjent otrzymał ..... ml środka kontrastowego po 30 min opuścił pracownię TK w stanie dobrym

.....  
(podpis pacjenta/opiekuna)